



検査 	医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項												
	点滴		輸血	内服	うがい	生活											
	血内	抗癌剤(副)		DIC予防(主)	制吐剤	高尿酸血症予防	感染予防	含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン			
	無し	キロサイド +生食 480ml	イダマイジン +生食 105ml	ラクテック +メイロン +ヘパリン 1500ml	KN3B +メイロン +ヘパリン 1500ml	濃厚血小板 血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	ザイロリック	イトリゾール	ザイロリックH 含漱	イソジグ	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体重 1日3件
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時								① 1 (朝食前)									kg
7時								③ 3 (朝食後)									
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時								③ 3 (昼食後)									kg
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時								③ 3 (夕食後)	④ 4 (夕食後)								kg
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	
備考欄																	

同day2

備考

血液検査
有り

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「キロサイド」症状	「イダマイジン」症状	「ナゼアOD」症状	「ラクテック」症状	「ザイロリック」症状
<p>ショック 食欲不振 悪心 嘔吐 消化管障害 悪心 間質性肺炎 嘔吐 急性心膜炎 心嚢液貯留 骨髄機能抑制に伴う血液障害 急性呼吸促進症候群</p>	<p>嘔吐 ショック 悪心 口内炎 下痢 骨髄抑制 脱毛 心筋障害 完全房室ブロック等の不整脈 食欲不振</p>	<p>皮疹 発熱 頭痛 頭重</p>	<p>細胞外液の補給・補正</p>	<p>発熱 ● ○ ○ ○ ○ ● 発疹</p>