



day4 (/)

day5 (/) day6 (/) day7 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項														
検査	点滴	輸血	内服			うがい	生活									
血内	抗癌剤(副)	DIC予防(主)		制吐剤			高尿酸血症予防	感染予防	含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン	
無し	キロサイド +生食 480ml	ラクテック +メイロン +ヘパリン 1500ml	KN3B +メイロン +ヘパリン 1500ml	血小板	赤血球	ナゼアOD	ザイロリック	リトリゾール	ザイロリックH 含漱	イソジNG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体重 1日3件	
0時																
1時																
2時																
3時																
4時																
5時																
6時						1 (朝食前)										
7時							3 (朝食後)									
8時																
9時																
10時																
11時																
12時																
13時							3 (昼食後)									
14時																
15時																
16時																
17時																
18時																
19時							3 (夕食後)	4 (夕食後)								
20時																
21時																
22時																
23時																
備考欄																

同 day4	同 day4	同 day4
備考 1.血液検査 有り		

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ●● 症状がある・つらい ●●● 症状がひどい・重い

「キロサイド」症状	「イダマイシン」症状	「ナゼアOD」症状	「ラクテック」症状	「ザイロリック」症状
ショック 食欲不振 悪心 嘔吐 消化管障害 間質性肺炎 急性心膜炎 心嚢液貯留 骨髄機能抑制に伴う血液障害 急性呼吸促進症候群	嘔吐 ショック 口内炎 骨髄抑制 心筋障害 下痢 脱毛 完全房室ブロック等の不整脈 食欲不振	皮疹 発熱 頭痛 頭重	細胞外液の補給・補正	発熱 発疹