



day1 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項															
検査	点滴	輸血	内服				うがい	生活									
血内1	血内2	抗癌剤		制吐剤		含漱		準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン						
有り	無し	メントレキセート-1 100ml	メントレキセート-2 48ml	ソルメドロール	濃厚血小板血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	シプロキサ	ジフルカン	ソビラックス	ザイロリック含漱	イソジソG	拘束	加熱食	室内トイレ	体温、脈拍、血圧	体重 1日1回
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時																	
7時																	
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時																	
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時																	
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	

備考欄 CRならば血2とする

day2 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項																
検査	点滴	輸血	内服				うがい	生活										
血内1	血内2	抗癌剤		随注		制吐剤		含漱		準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン					
無し	無し	メントレキセート-2 48ml	キロサイドFN+生食 400ml	ソルメドロール	メントレキセート	濃厚血小板血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	シプロキサ	ジフルカン	ソビラックス	ザイロリック含漱	イソジソG	拘束	加熱食	室内トイレ	体温、脈拍、血圧	体重 1日1回
0時																		
1時																		
2時																		
3時																		
4時																		
5時																		
6時																		
7時																		
8時																		
9時																		
10時																		
11時																		
12時																		
13時																		
14時																		
15時																		
16時																		
17時																		
18時																		
19時																		
20時																		
21時																		
22時																		
23時																		

備考欄

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ●● 症状がある・つらい ●●● 症状がひどい・重い

「メントレキセート」症状

「キロサイド」症状

「ソルメドール」症状

「キロサイド」症状

「ナゼアOD」症状

「シプロキサ」症状

「ジフルカン」症状

「ソビラックス」症状

「ロイコリン」症状