急性リンパ性白血病　hyper-CVAD療法（1）



day3（　/　）

	医師にやってもらうこと							患者さんの注意事項										
	検査		点滴			輸血		内服				うがい		生活				
	血内1	血内2	抗癌剤		葉酸救援			制吐剤				含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン
	有り	有り	キロサイドN＋生食 400ml	ソルメドロール	ロイコボリン	血小板	赤血球	ナゼアOD	シプロキサン	ジフルカン	ゾビラックス	ザイロリック含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図モニター	「体温、脈拍、血圧」	体重 1日1回
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時								1（朝食前）	6（朝食後）		2（朝食後）								
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時									6（昼食後）										
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時									6（晩食後）	2C（晩食後）	2（晩食後）								
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			

備考欄　CRならば血２とする

day4（　/　）

	医師にやってもらうこと							患者さんの注意事項										
	検査		点滴			輸血		内服				うがい		生活				
	血内1	血内2	抗癌剤		葉酸救援			制吐剤				含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン
	無し	無し	キロサイドN＋生食 400ml	ロイコボリン		血小板 200ml	赤血球 200ml	ナゼアOD	シプロキサン	ジフルカン	ゾビラックス	ザイロリック含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図モニター	「体温、脈拍、血圧」	体重 1日1回
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時								1（朝食前）	6（朝食後）		2（朝食後）								
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時									6（昼食後）										
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時									6（晩食後）	2C（晩食後）	2（晩食後）								
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			

備考欄

※副作用　症状の重さ　○ 症状はない　◎ 少し症状がある　● 症状がある・つらい　● 症状がひどい・重い

「メソトレキセート」症状



「キロサイドN」症状



「ソルメドール」症状



「キロサイド」症状



「ナゼアOD」症状



「シプロキサン」症状



「ジフルカン」症状



「ゾビラックス」症状



「ロイコボリン」症状