



day5 (/)

day6 (/)

day7
(/)

	医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項												
	検査	点滴	輸血	皮下注	内服		うがい	生活									
	血内1	血内2	葉酸救援	G-CSF			含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン					
	有り	有り	ロイコポン	血小板	赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図モニター	体温、脈拍、血圧	体重 1日1回
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時																	
7時																	
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時																	
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時																	
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	
	備考欄																

	医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項												
	検査	点滴	輸血	皮下注	内服		うがい	生活									
	血内2	葉酸救援	G-CSF			含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン						
	無し	ロイコポン	血小板	赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図モニター	体温、脈拍、血圧	体重 1日1回	
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時																	
7時																	
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時																	
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時																	
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	
	備考欄																

同 day6

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「シプロキサ」症状	「ジフルカン」症状	「ソピラックス」症状	「ロイコポン」症状	「グラン」症状
ショック 汎血球減少 大腸炎 低血糖 骨髄抑制 間質性肺炎 無顆粒球症 血小板減少 アナフィラキシー様症状 横紋筋融解症	血液障害 中毒性表皮壊死症 肝障害 高K血症 急性腎不全 痙攣 皮膚粘膜眼症候群 意識障害	せん妄 妄想 DIC 血小板減少 急性腎不全 意識障害 汎血球減少 無顆粒球症 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様症状	骨髄抑制 脱水症状 ショック 肝硬変 重篤な肝障害 狭心症 溶血性貧血等の血液障害 重篤な腸炎 白質脳症等を含む精神神経障害 アナフィラキシー様症状	間質性肺炎 ショック 脾破裂 急性呼吸窮迫症候群 芽球の増加