

day1 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項															
検査	点滴	輸血	内服				うがい	生活									
血内1	血内2	抗癌剤		制吐剤		含漱		準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン						
有り	無し	メントレキセート-1 100ml	メントレキセート-2 48ml	ソルメドロール	濃厚血小板 血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	体温、脈拍、 血圧	体重 1日1回
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時																	
7時																	
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時																	
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時																	
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	

備考欄 CRならば血2とする


day2 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項																
検査	点滴	輸血	内服				うがい	生活										
血内1	血内2	抗癌剤		随注		制吐剤		含漱		準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン					
無し	無し	メントレキセート-2 48ml	キロサイドN +生食 400ml	ソルメドロール	メントレキセート	濃厚血小板 血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	体温、脈拍、 血圧	体重 1日1回
0時																		
1時																		
2時																		
3時																		
4時																		
5時																		
6時																		
7時																		
8時																		
9時																		
10時																		
11時																		
12時																		
13時																		
14時																		
15時																		
16時																		
17時																		
18時																		
19時																		
20時																		
21時																		
22時																		
23時																		

備考欄

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

<p>「メントレキセート」症状</p> <p>急性腎不全 肺線維症</p> <p>ショック 劇症肝炎</p> <p>間質性肺炎 感染症</p> <p>骨髄抑制 肝不全</p> <p>重症ネフロパチー 尿管壊死</p>	<p>「キロサイドN」症状</p> <p>シタラピン症候群 ショック</p> <p>不整脈 消化管障害</p> <p>黄疸 間質性肺炎</p> <p>心不全 肝機能障害</p> <p>骨髄機能抑制に伴う血液障害 急性呼吸促進症候群</p>	<p>「ソルメドール」症状</p> <p>胃腸穿孔 消化管出血</p> <p>ショック うつ状態</p> <p>骨粗鬆症 糖尿病</p> <p>感染症 消化性潰瘍</p> <p>続発性副腎皮質機能不全 骨髄無菌性壊死</p>	<p>「キロサイド」症状</p> <p>ショック 食欲不振</p> <p>消化管障害 悪心</p> <p>間質性肺炎 嘔吐</p> <p>急性心膜炎 心嚢液貯留</p> <p>急性呼吸促進症候群 骨髄機能抑制に伴う血液障害</p>	<p>「ナゼアOD」症状</p> <p>皮疹</p> <p>発熱 頭痛 頭重</p>
<p>「シプロキサ」症状</p> <p>ショック 汎血球減少</p> <p>大腸炎 低血糖</p> <p>骨髄抑制 間質性肺炎</p> <p>無顆粒球症 血小板減少</p> <p>アナフィラキシー様症状 横紋筋融解症</p>	<p>「ジフルカン」症状</p> <p>血液障害 中毒性表皮壊死症</p> <p>肝障害 高K血症</p> <p>急性腎不全 痙攣</p> <p>皮膚粘膜眼症候群 意識障害</p>	<p>「ソピラックス」症状</p> <p>せん妄 妄想</p> <p>DIC 血小板減少</p> <p>急性腎不全 意識障害</p> <p>汎血球減少 無顆粒球症</p> <p>アナフィラキシーショック アナフィラキシー様症状</p>	<p>「ロイコリン」症状</p> <p>骨髄抑制 脱水症状</p> <p>ショック 肝硬変</p> <p>重篤な肝障害 狭心症</p> <p>アナフィラキシー様症状 重篤な腸炎</p> <p>白質脳症等を含む精神神経障害 溶血性貧血等の血液障害</p>	



day3 (/)

医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項															
検査		点滴		輸血		内服				うがい		生活							
血内1	血内2	抗癌剤		葉酸救援		制吐剤		含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン					
有り	有り	キロサイドN +生食 400ml	ソルメド ロール	ロイコボン	血小板	赤血球	ナゼアOD	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体温、脈拍 、血圧	体重 1日1回	
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時							①1 (朝食前)												
7時								①6 (朝食後)			①2 (朝食後)								
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時								①6 (昼食後)											
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時							①6 (夕食後)			②6 (夕食後)	①2 (夕食後)								
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			

備考欄 CRならば血2とする


day4 (/)

医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項															
検査		点滴		輸血		内服				うがい		生活							
血内1	血内2	抗癌剤		葉酸救援		制吐剤		含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン					
無し	無し	キロサイドN +生食 400ml	ロイコボン	血小板 200ml	赤血球 200ml	ナゼアOD	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体温、脈拍 、血圧	体重 1日1回		
0時																			
1時																			
2時																			
3時																			
4時																			
5時																			
6時																			
7時																			
8時																			
9時																			
10時																			
11時																			
12時																			
13時																			
14時																			
15時																			
16時																			
17時																			
18時																			
19時																			
20時																			
21時																			
22時																			
23時																			

備考欄

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

<p>「メソトレキセート」症状</p> <p>急性腎不全 肺線維症</p> <p>ショック 劇症肝炎</p> <p>間質性肺炎 感染症</p> <p>骨髄抑制 肝不全</p> <p>重症ネフロパチー 尿管壊死</p>	<p>「キロサイドN」症状</p> <p>ショック シタリン症候群</p> <p>不整脈 消化管障害</p> <p>黄疸 間質性肺炎</p> <p>心不全 肝機能障害</p> <p>骨髄機能抑制に伴う血液障害 急性呼吸促進症候群</p>	<p>「ソルメドール」症状</p> <p>胃腸穿孔 消化管出血</p> <p>ショック うつ状態</p> <p>骨粗鬆症 糖尿病</p> <p>感染症 消化性潰瘍</p> <p>続発性副腎皮質機能不全 骨髄無菌性壊死</p>	<p>「キロサイド」症状</p> <p>ショック 食欲不振</p> <p>消化管障害 悪心</p> <p>間質性肺炎 嘔吐</p> <p>急性心膜炎 心嚢液貯留</p> <p>急性呼吸促進症候群 骨髄機能抑制に伴う血液障害</p>	<p>「ナゼアOD」症状</p> <p>皮疹</p> <p>発熱 頭痛 頭重</p>	<p>「シプロキサ」症状</p> <p>ショック 汎血球減少</p> <p>大腸炎 低血糖</p> <p>骨髄抑制 間質性肺炎</p> <p>無顆粒球症 血小板減少</p> <p>アナフィラキシー様症状 横紋筋融解症</p>
<p>「ジフルカン」症状</p> <p>血液障害 中毒性表皮壊死症</p> <p>肝障害 高K血症</p> <p>急性腎不全 痙攣</p> <p>皮膚粘膜眼症候群 意識障害</p>	<p>「ソピラックス」症状</p> <p>せん妄 妄想</p> <p>DIC 血小板減少</p> <p>急性腎不全 意識障害</p> <p>汎血球減少 無顆粒球症</p> <p>アナフィキシーショック アナフィラキシー様症状</p>	<p>「ロイコボン」症状</p> <p>骨髄抑制 脱水症状</p> <p>ショック 肝硬変</p> <p>重篤な肝障害 狭心症</p> <p>溶血性貧血等の血液障害 重篤な腸炎</p> <p>白質脳症等を含む精神神経障害 アナフィラキシー様症状</p>			



day5 (/)

day6 (/)

day7 (/)


	医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項												
	検査	点滴	輸血	皮下注	内服		うがい	生活									
	血内1	血内2	葉酸救援	G-CSF			含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン					
	有り	有り	ロイコポン	血小板	赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図モニター	体温、脈拍、血圧	体重 1日1回
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時																	
7時																	
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時																	
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時																	
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	
備考欄																	

	医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項												
	検査	点滴	輸血	皮下注	内服		うがい	生活									
	血内2	葉酸救援	G-CSF			含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン						
	無し	ロイコポン	血小板	赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図モニター	体温、脈拍、血圧	体重 1日1回	
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時																	
7時																	
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時																	
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時																	
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	
備考欄																	

同 day6

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ●● 症状がある・つらい ●●● 症状がひどい・重い

「シプロキサ」症状	「ジフルカン」症状	「ソピラックス」症状	「ロイコポン」症状	「グラン」症状
ショック 大腸炎 骨髄抑制 無顆粒球症 アナフィラキシー様症状 汎血球減少 低血糖 間質性肺炎 血小板減少 横紋筋融解症	血液障害 肝障害 急性腎不全 皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症 高K血症 痙攣 意識障害	せん妄 妄想 DIC 急性腎不全 汎血球減少 アナフィラキシーショック 血小板減少 意識障害 無顆粒球症 アナフィラキシー様症状	骨髄抑制 ショック 重篤な肝障害 溶血性貧血等の血液障害 白質脳症等を含む精神神経障害 脱水症状 肝硬変 狭心症 重篤な腸炎 アナフィラキシー様症状	間質性肺炎 ショック 急性呼吸窮迫症候群 脾破裂 芽球の増加



day8 (/)

	医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項														
	検査	点滴	輸血	皮下注	内服		うがい	生活									
	血内2	随注	葉酸救援	G-CSF			含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン					
	有り	キロサイドN +生食	ロイコリン	血小板	赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍 、血圧」	体重 1日1回
0時																	
1時																	
2時																	
3時																	
4時																	
5時																	
6時																	
7時																	
8時																	
9時																	
10時																	
11時																	
12時																	
13時																	
14時																	
15時																	
16時																	
17時																	
18時																	
19時																	
20時																	
21時																	
22時																	
23時																	
備考欄																	

day9 (/)


	医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項						
	検査	輸血	皮下注	内服		うがい			
	血内2	G-CSF				含漱			
	無し	血小板	赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG
0時									
1時									
2時									
3時									
4時									
5時									
6時									
7時									
8時									
9時									
10時									
11時									
12時									
13時									
14時									
15時									
16時									
17時									
18時									
19時									
20時									
21時									
22時									
23時									
備考欄									

day10 day11 day12 day13 day14
(/) (/) (/) (/) (/)

同 day 9	同 day 9	同 day 9	同 day 9	同 day 9
備考 1.血液検査 有り		備考 1.血液検査 有り		

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ●● 症状がある・つらい ●●● 症状がひどい・重い

「シプロキサ」症状	「ジフルカン」症状	「ソピラックス」症状	「ロイコリン」症状	「グラン」症状
ショック 汎血球減少 大腸炎 低血糖 骨髄抑制 間質性肺炎 無顆粒球症 血小板減少 アナフィラキシー様症状 横紋筋融解症	血液障害 中毒性表皮壊死症 肝障害 高K血症 急性腎不全 痙攣 皮膚粘膜眼症候群 意識障害	せん妄 妄想 DIC 血小板減少 急性腎不全 意識障害 汎血球減少 無顆粒球症 アナフィキシーショック アナフィラキシー様症状	骨髄抑制 脱水症状 ショック 肝硬変 重篤な肝障害 狭心症 溶血性貧血等の血液障害 重篤な腸炎 白質脳症等を含む精神神経障害 アナフィラキシー様症状	間質性肺炎 ショック 脾破裂 急性呼吸窮迫症候群 芽球の増加



day15 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項					
検査	輸血	内服			うがい		
血内2						含漱	
有り	血小板 200ml	赤血球 200ml	シプロキサン	ジフルカン	ソビラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG
0時							
1時							
2時							
3時							
4時							
5時							
6時							
7時							
8時							
9時							
10時							
11時							
12時							
13時							
14時							
15時							
16時							
17時							
18時							
19時							
20時							
21時							
22時							
23時							
備考欄							

day16 day17 day18 day19 day20 day21 day22
(/) (/) (/) (/) (/) (/) (/)

同 day15	同 day15	同 day15	同 day15	同 day15	同 day15	同 day15
備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し	備考 1.血液検査 無し	

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「シプロキサン」症状	「ジフルカン」症状	「ソビラックス」症状
<p>ショック 汎血球減少 低血糖 大腸炎 骨髄抑制 無顆粒球症 アナフィラキシー様症状 横紋筋融解症 間質性肺炎 血小板減少</p>	<p>血液障害 肝障害 急性腎不全 皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症 高K血症 痙攣 意識障害</p>	<p>せん妄 妄想 DIC 急性腎不全 汎血球減少 アナフィラキシーショック 血小板減少 意識障害 無顆粒球症 アナフィラキシー様症状</p>