



day11 ( / )

医師にやってもらうこと						患者さんの注意事項						
検査		点滴		輸血		皮下注		内服			うがい	
血内1	血内2	抗癌剤				G-CSF		制吐剤		含漱		
無し	無し	オンコピン +生食 50ml	デカドロン	血小板	赤血球	グラン 48ml	ナゼアOD	シプロキサン	ジフルカン	ソビラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG
0時												
1時												
2時												
3時												
4時												
5時												
6時												
7時												
8時												
9時												
10時												
11時												
12時												
13時												
14時												
15時												
16時												
17時												
18時												
19時												
20時												
21時												
22時												
23時												
備考欄												

day12 ( / )

医師にやってもらうこと						患者さんの注意事項						
検査		点滴		輸血		皮下注		内服			うがい	
血内2	抗癌剤	G-CSF						含漱				
有り	デカドロン	血小板	赤血球	グラン	シプロキサン	ジフルカン	ソビラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG			
0時												
1時												
2時												
3時												
4時												
5時												
6時												
7時												
8時												
9時												
10時												
11時												
12時												
13時												
14時												
15時												
16時												
17時												
18時												
19時												
20時												
21時												
22時												
23時												
備考欄												

day13 day14  
( / ) ( / )

同day 1 2 (血液 検査無し)	同day 1 2 (血液 検査無し)
--------------------------	--------------------------

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

<p>「デカドロン」症状</p> <p>精神変調 アナフィラキシー様反応 消化管穿孔 ショック 肺炎 消化性潰瘍 持続性副腎皮質機能不全 糖尿病 感染症の増悪 誘発感染症</p>	<p>「ナゼアOD」症状</p> <p>皮疹 発熱 頭痛 頭重</p>	<p>「シプロキサン」症状</p> <p>ショック 汎血球減少 大腸炎 低血糖 骨髄抑制 間質性肺炎 無顆粒球症 血小板減少 アナフィラキシー様症状 横紋筋融解症</p>	<p>「ジフルカン」症状</p> <p>血液障害 中毒性表皮壊死症 肝障害 高K血症 急性腎不全 痙攣 皮膚粘膜眼症候群 意識障害</p>	<p>「ソビラックス」症状</p> <p>せん妄 妄想 DIC 血小板減少 急性腎不全 意識障害 汎血球減少 無顆粒球症 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様症状</p>
<p>「オンコピン」症状</p> <p>SIADH 骨髄抑制 イレウス 消化管出血 錯乱 心筋虚血 昏睡 消化管穿孔 末梢神経障害 アナフィラキシー様症状</p>	<p>「グラン」症状</p> <p>間質性肺炎 ショック 脾破裂 急性呼吸窮迫症候群 芽球の増加</p>			