



day1 ( / )

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項												
点滴		検査	内服			生活								
Rituximab		抗癌剤			血算+生化学	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン			
リクキシマブ	エンドキサン	アドリアシン	オンコピン	ラクテック500 +メイロン1A +ヘパリン1000u	有り	プレドニン	カロナール	ボラミン	一般病室	常食	一般トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍、 血圧」	体重 1日1回
0時														
1時														
2時														
3時														
4時														
5時														
6時						①20 (朝食後)								
7時														
8時														
9時														
10時														
11時														
12時														
13時						①20 (昼食後)								
14時														
15時														
16時														
17時														
18時														
19時							①2 (晩食後)	①1 (晩食後)						
20時														
21時														
22時														
23時														
備考欄														

day2 ( / )

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項												
点滴		内服	生活											
Rituximab		抗癌剤			血算+生化学	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン			
リクキシマブ	エンドキサン	アドリアシン	オンコピン	ラクテック500 +メイロン1A +ヘパリン1000u	有り	プレドニン	カロナール	ボラミン	一般病室	常食	一般トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍、 血圧」	体重 1日1回
0時														
1時														
2時														
3時														
4時														
5時														
6時						①20 (朝食後)								
7時														
8時														
9時														
10時														
11時														
12時														
13時						①20 (昼食後)								
14時														
15時														
16時														
17時														
18時														
19時														
20時														
21時														
22時														
23時														
備考欄														

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少しい症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

<p>「プレドニン」症状</p> <p>感染症の増悪 糖尿病</p> <p>誘発感染症 肺炎</p> <p>消化管潰瘍 消化管穿孔</p> <p>持続性副腎皮質機能不全 精神変調、うつ状態</p>	<p>「エンドキサン」症状</p> <p>間質性肺炎 胃腸出血</p> <p>ショック 排尿障害</p> <p>骨髄抑制 心筋障害</p> <p>イレウス 肺線維症</p> <p>アナフィラキシー様症状 出血性膀胱炎</p>	<p>「オンコピン」症状</p> <p>SIADH 骨髄抑制</p> <p>イレウス 消化管出血</p> <p>錯乱 心筋虚血</p> <p>昏睡 消化管穿孔</p> <p>末梢神経障害 アナフィラキシー様症状</p>	<p>「アドリアシン」症状</p> <p>心毒性</p> <p>骨髄抑制 心筋障害</p> <p>食不振 うっ血性心不全</p>	<p>「ナゼアD」症状</p> <p>皮疹</p> <p>発熱 頭痛 頭重</p>	<p>「ボラミン」症状</p> <p>錯乱</p> <p>痙攣 ショック</p> <p>再生不良性貧血 無顆粒球症</p>
<p>「カロナール」症状</p> <p>鎮痛</p>					