

day1 ( / )

医師にやってもらうこと					患者さんの注意事項							
点滴				検査	生活							
抗癌剤				制吐剤	点滴投与 (細胞外液)	血算 +生化学	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン	
アドリアシン +生食 100ml	ブレオ +生食 500ml	エクザール +生食 50ml	ダカルバシン +生食 500ml	ナゼア	ラクテック 500		一般病室	常食	一般トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍 、血圧」	体重 1日1回
0時												
1時												
2時												
3時												
4時												
5時												
6時												
7時												
8時												
9時												
10時												
11時												
12時												
13時												
14時												
15時												
16時												
17時												
18時												
19時												
20時												
21時												
22時												
23時												
備考欄												

day2 ( / )

患者さんの注意事項					
生活					
準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン	
一般病室	常食	一般トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍 、血圧」	体重 1日1回
0時					
1時					
2時					
3時					
4時					
5時					
6時					
7時					
8時					
9時					
10時					
11時					
12時					
13時					
14時					
15時					
16時					
17時					
18時					
19時					
20時					
21時					
22時					
23時					
備考欄					

day3 ( / )

患者さんの注意事項					
生活					
準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン	
一般病室	常食	一般トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍 、血圧」	体重 1日1回
0時					
1時					
2時					
3時					
4時					
5時					
6時					
7時					
8時					
9時					
10時					
11時					
12時					
13時					
14時					
15時					
16時					
17時					
18時					
19時					
20時					
21時					
22時					
23時					
備考欄					

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「アドリアシン」症状	「ブレオ」症状	「エクザール」症状	「ダカルバシン」症状	「ナゼア(精注)」症状
<p>心筋障害・</p> <p>心毒性</p> <p>食思不振</p> <p>うっ血背性心不全</p> <p>骨髄抑制</p>	<p>肺線維症</p> <p>間質性肺炎</p>	<p>錯乱</p> <p>昏睡</p> <p>痙攣</p> <p>骨髄抑制</p> <p>知覚異常</p> <p>昏蒙</p> <p>末梢神経炎</p> <p>レイウス</p> <p>アナフィラキシー様症状</p> <p>消化管出血</p>	<p>肝静脈血栓症</p> <p>重篤な肝障害</p> <p>骨髄機能抑制</p> <p>アナフィラキシーショック</p>	<p>ショック</p> <p>アナフィラキシー様症状</p> <p>てんかん様発作</p>