



白血球



白血病球





day1 (/)



		医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項										
検査	点滴		輸血		内服			うがい		生活						
血内	抗癌剤(副)		DIC予防(主)				制吐剤	高尿酸血症予防	感染予防	含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン
有り	キロサイド +生食 480ml	インドマイシン +生食 105ml	ラクテック +メイロン +ヘパリン 1500ml	KN3B +メイロン +ヘパリン 1500ml	濃厚血小板 血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	ザイロリック	イトリゾール	ザイロリックH 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体重 1日3件
0時																
1時																
2時																
3時																
4時																
5時																
6時																
7時																
8時																
9時																
10時																
11時																
12時																
13時																
14時																
15時																
16時																
17時																
18時																
19時																
20時																
21時																
22時																
23時																
備考欄																

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い







day8 (/)

	医師にやってもらうこと			患者さんの注意事項												
	検査	点滴	輸血	内服		うがい	生活					モニター	バイタルサイン			
	血内	抗癌剤(副)	DIC予防(主)	制吐剤	高尿酸血症予防	感染予防	含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン				
有り	キロサイド +生食 480ml	ラクテック +メイロン +ヘパリン 1500ml	KN3B +メイロン +ヘパリン 1500ml	血小板	赤血球	ナゼアOD	ザイロリック	リトリゾール	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体重 1日3件	
0時																
1時																
2時																
3時																
4時																
5時																
6時						1 (朝食前)										kg
7時							3 (朝食後)									
8時																
9時																
10時																
11時																
12時							3 (昼食後)									kg
13時																
14時																
15時																
16時																
17時																
18時							3 (夕食後)	4 (夕食後)								kg
19時																
20時																
21時																
22時																
23時																
備考欄	<p>口内炎発現時はスペシャルうがい1本を処方する。1日4回</p>															

day9 (/)

	医師にやってもらうこと			患者さんの注意事項									
	検査	点滴	輸血	皮下注	内服	うがい	生活					モニター	バイタルサイン
	血内	維持輸液		G-CSF	感染予防	含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン		
無し		血小板	赤血球	グラン	リトリゾール	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体重 1日3件		
0時													
1時													
2時													
3時													
4時													
5時													
6時												kg	
7時													
8時													
9時													
10時													
11時													
12時												kg	
13時													
14時													
15時													
16時													
17時													
18時												kg	
19時													
20時													
21時													
22時													
23時													
備考欄	<p>口内炎発現時はスペシャルうがい1本を処方する。1日4回</p>												





day10 (/)

	医師にやってもらうこと			患者さんの注意事項								
	検査	輸血		皮下注	内服	うがい	生活					
	検査 +生化学 +CRP	血小板	赤血球	G-CSF グラン	感染予防 トリゾール	含漱 イソジンG	準無菌室 拘束	食事 加熱食	排泄 室内トイレ	バイタルサイン 体重 1日3件		
0時												
1時												
2時												
3時												
4時												
5時												
6時												
7時												
8時												
9時												
10時												
11時												
12時												
13時												
14時												
15時												
16時												
17時												
18時												
19時												
20時												
21時												
22時												
23時												
備考欄	口内炎発現時はスペシャルうがい1本を処方する。1日4回											

day11 day12 day13 day14 day15 day16 day17 day18 day19 day20 day21 day22
(/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/)

同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10	同day10
備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し	備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し	備考 1.血液検査 無し

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「ナゼアOD」症状	「グラン」症状
<p>皮疹</p> <p>発熱 頭痛 頭重</p>	<p>間質性肺炎</p> <p>ショック 脾破裂</p> <p>急性呼吸窮迫症候群 芽球の増加</p>